

## Telefonische bereikbaarheid

Onderstaande nummers mag u altijd bellen bij twijfels en/of vragen

Algemeen nummer UMCG: 050 3616161

\* Tussen 8.30 uur en 16.30 uur:

Oncologie verpleegkundige / Verpleegkundig specialist

- Margreet van Nijen           toestelnummer 69405
- Henny van Essen           toestelnummer 69382
- Yvonne van Straalen       toestelnummer 69376
- Jaap Feenstra           toestelnummer 69400
- Sophie Bunskoek       toestelnummer 69384

Voor algemene vragen aan de verpleegkundigen kunt u vragen naar piepernummer 77136.

\* Tussen 16.30 uur en 08.30 uur en in het weekend:

Verpleegafdeling oncologie D2VA:       050 3614436

Bij geen gehoor, graag later weer proberen of bellen naar 050 3614435

*(ook als u nooit opgenomen bent geweest op verpleegafdeling D2VA)*

## **Situaties waarin u direct telefonisch contact op moet nemen met het ziekenhuis:**

### **Koorts:**

- bij één keer koorts boven 38.5 graden
- bij twee maal achter elkaar 38 graden koorts in een tussentijd van 6 uur
- bij koude rillingen

### **Misselijkheid en braken:**

- bij ernstig en aanhoudend braken gedurende 24 uur of langer
- bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

### **Diarree:**

- bij langer dan 24 uur aanhoudende diarree
- bij tekenen van uitdroging: droge mond, droge huid, weinig of niet meer plassen, donkere urine

### **Obstipatie/Verstopping van de ontlasting:**

- bij langer dan drie dagen aanhoudende obstipatie (harde ontlasting en/of verstopping)

### **andere situaties waarin u direct moet bellen:**

- bij aanhoudend bloeden van een wondje (langer dan 15 minuten)
- bij een lang aanhoudende bloedneus (langer dan 15 minuten)
- bij heviger bloedverlies tijdens menstruatie
- bij hartkloppingen en duizeligheid
- bij plotseling optredende kortademigheid, een gevoel van benauwdheid of een snelle ademhaling die u niet kunt corrigeren
- bij pijnlijke plekjes in de mond en moeite met slikken waardoor u niet kunt eten of drinken
- bij een pijnlijk en branderig gevoel bij het plassen
- bij aanhoudende pijn of een branderig gevoel op de plaats van toediening van cytostatica
- bij pijnlijke handen en voeten
- bij elk ander nieuw verschijnsel