

Voorschrift voor medicijnen tegen de misselijkheid voor thuis

Bij de chemotherapiekuur die u krijgt is metoclopramide (*metoclopramide* = *Primperan*®) de eerste keus bij misselijkheid en / of braken.

Bij misselijkheidklachten

Start met 4 maal daags 1 tablet metoclopramide 10 mg voor de maaltijden en voor de nacht. Bij onvoldoende effect kan de dosis worden verhoogd tot 4 maal daags 20 mg (= 2 tabletten). Als u de tabletten niet binnenhoudt moet u contact opnemen om zepillen voor te laten schrijven. Metoclopramide kan worden ingenomen totdat de klachten over zijn.

Mogelijke bijwerkingen

Hieronder een overzicht van de mogelijke bijwerkingen. Als u andere bijwerkingen bemerkt dan dat hier beschreven staan, moet u altijd contact opnemen met de medische oncologie van het UMCG .

Medicijn	Mogelijke bijwerking	Advies / uitleg
Metoclopramide	<ol style="list-style-type: none">1. Stijf gevoel in de kaak, de tong en/of de nekspieren2. Kan het reactievermogen beïnvloeden	<ul style="list-style-type: none">· Als u hier last van heeft, moet u bellen met de medische oncologie UMCG.· Pas op met deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Recept

Bij de eerste kuur ontvangt u van uw arts een recept voor metoclopramide. Vraag uw arts een nieuw recept als uw voorraad medicijnen tegen misselijkheid en braken onvoldoende is.