

Dexamethason bij Docetaxel (eens per 3 weken)

Dag van inname	Medicatie	Tijd van inname
Avond voor toediening chemotherapie	Dexamethason 8 mg	20.00
Dag van toediening chemotherapie	Dexamethason 8 mg	20.00 uur
Dag 1,2 na toediening chemotherapie	Dexamethason 8 mg	8.00 & 20.00 uur
Dag 3 na toediening chemotherapie	Dexamethason 4 mg	8.00 uur & 20.00 uur
Dag 4 na toediening chemotherapie	Dexamethason 4 mg	8.00 uur

Bij misselijkheidklachten ondanks dexamethason

Start met 4 maal daags 1 tablet metoclopramide 10 mg (*Metoclopramide = Primperan®*) voor de maaltijden en voor de nacht. Bij onvoldoende effect kan de dosis worden verhoogd tot 4 maal daags 20 mg (= 2 tabletten). Als u de tabletten uitbraakt moet u contact opnemen om zepillen voor te laten schrijven. Metoclopramide kan worden ingenomen totdat de klachten over zijn.

Mogelijke bijwerkingen

Hieronder een overzicht van mogelijke bijwerkingen. Als u andere bijwerkingen bemerkt dan dat hier beschreven staan, moet u altijd contact opnemen met de medische oncologie van het UMCG.

Medicijn	Mogelijke bijwerking	Advies / uitleg
Dexamethason	Hyperactiviteit, onrust, slapeloosheid	Bellen met medische oncologie UMCG.
Metoclopramide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stijf gevoel in de kaak, de tong en/of de nekspieren 2. Kan het reactievermogen beïnvloeden 	<ul style="list-style-type: none"> · Als u hier last van heeft, moet u bellen met de medische oncologie UMCG. · Pas op met deelname aan het verkeer en het bedienen van machines.

Recepten

Bij de eerste kuur ontvangt u van uw arts recepten voor de medicijnen. Vraag uw arts een nieuw recept als uw voorraad medicijnen tegen misselijkheid onvoldoende is.